

DENTE

Radice → **Infissa nella cavità mascellare**

Corona → **Parte libera del dente**

Colletto → **Strozzatura a livello della gengiva**

1 anno- 9 mesi = dentatura completa (alcuni 7 mesi)

DENTIZIONE

Prima dentizione



Da latte

Caduca

n° 32

Mancano i molari

Seconda dentizione



Da adulto

Permanente

n° 42

5 MESI

Incisivi	→	Corona trilobata = Fior di Giglio
Canini		Fiordaliso
Premolari	→	Più grandi dall'indietro in avanti
Molari	→	“ “ “ avanti all'indietro

Picozzi
Mediani
Cantoni

FORMULA DENTARIA

$$\text{Incisivi} = \frac{\text{superiori 3+3}}{\text{Inferiori 3+3}} = 12$$

$$\text{Canini} = \frac{\text{superiori 1+1}}{\text{inferiori 1+1}} = 4$$

$$\text{Premolari} = \frac{\text{superiori 4+4}}{\text{Inferiori 4+4}} = 16$$

$$\text{Molari} = \frac{\text{superiori 2+2}}{\text{Inferiori 3+3}} = 10$$

TOTALE 42

$$\text{Incisivi} = \frac{\text{Superiori } 3+3}{\text{Inferiori } 3+3} = 12$$

$$\text{Canini} = \frac{\text{Superiori } 1+1}{\text{Inferiori } 1+1} = 4$$

$$\text{Premolari} = \frac{\text{Superiori } 4+4}{\text{Inferiori } 4+4} = 16$$

TOTALE 32

VARIABILITA' = razza, sesso, ambiente (alimentazione, abitudini)

ANOMALIE

-assenza del fior di giglio = piccole razze da compagnia

-presenza di fiordaliso a 6-7 anni = soggetti ad ottima salute

-denti supplementari = dolicocefali

-denti mancanti = brachicefali

Diastema = intervallo tra canino e quarto premolare

CRONOLOGIA DENTARIA

1) Primo periodo: eruzione dei denti da latte



20 gg. mascella sup. canini e incisivi (cantoni, mediani, picozzi)

30 gg. “ inf. “ “

30 gg. secondo e terzo premolare

50 gg. primo premolare

4 mesi quarto premolare


Dopo i due mesi diradamento degli incisivi

SECONDO PERIODO



Consumo denti decidui

Agguagliamento = tutto il fiordaliso logorato



2 mesi - 2 mesi e mezzo = piccozzi inferiori

3 mesi - 3mesi e mezzo = mediani inferiori

4 mesi - 4mesi e mezzo = cantoni inferiori

TERZO PERIODO

4 - 5 mesi = caduta denti da latte



Dopo 4 mesi = picozzi

4 mesi e mezzo = mediani

5 mesi = cantoni

canini inferiori

denti superiori

**6 mesi = rimpiazzamento incisivi e
canini**

5-7 mese = molari da adulto

QUARTO PERIODO



Agguagliamento denti permanenti

1 anno = dentatura completa

15 mesi = spianamento (lobo mediano logorato) picozzi inferiori

18 mesi = agguagliamento picozzi inferiori

21 mesi = spianamento mediani inferiori

2 anni e mezzo - 3 = agguagliamento mediani inferiori inizio
spianamento picozzi superiori

3 anni e mezzo - 4 = agguagliamento picozzi superiori e spianament
cantoni superiori

4 - 5 anni = agguagliamento mediani superiori

dopo 5 anni = raccorciamento progressivo incisivi

**dopo 6 anni = cantoni superiori e canini sup. ed inf.
Iniziano a smussarsi**